



## Фитофтороз побежден!

### ФУНГИЦИД

диметоморф, 200 г/л  
+ флуазинам, 200 г/л

- Эффективная профилактика и быстрая остановка развития патогенов, продолжительная защита культур
- Разнонаправленный механизм действия, предотвращение резистентности у патогенов
- Надежная защита листьев, стеблей и клубней картофеля от фитофтороза и альтернариоза
- Устойчивость к осадкам и орошению

®  
Д  
М  
А  
С  
И  
Н

# Инсайд® – комбинированный фунгицид контактного и локально-системного действия для защиты картофеля, лука и винограда

Препарат выпускается в форме суспензионного концентрата.

Инсайд® содержит два д. в. разнонаправленного механизма действия. **Диметоморф** – системный фунгицид для борьбы с заболеваниями, вызываемыми патогенами из класса Оомицеты. Особенно эффективен против фитофтороза картофеля и милдью винограда. Обладает длительным остаточным защитным и лечащим действием. Не вызывает кросс-резистентности с наиболее часто применяемыми фунгицидами из других химических классов. При проведении последовательных обработок Инсайдом® наблюдается эффект пролонгированного действия диметоморфа в ботве картофеля, фунгицидная активность этого ингредиента усиливается.

**Флуазинам** ингибирует процессы образования зооспор, формирования аптессориев, внедрения и роста гифов патогена. Защищает растения до 8 – 10 дней. Высокая активность против зооспор возбудителя фитофтороза картофеля делает флуазинам незаменимым и особенно эффективным для предотвращения инфицирования клубней.

Инсайд® начинает действовать сразу после обработки. Защитное действие препарата в период высокой инфекционной нагрузки составляет 7 – 10 дней, при профилактических плановых мероприятиях – 10 – 14 дней с момента обработки, в зависимости от погодных условий, инфекционной нагрузки, устойчивости сорта, типа системы орошения.

Опрыскивания **картофеля** проводят в период вегетации: первое – не позднее фазы смыкания ботвы в рядах, последующие – с интервалом 7 – 10 дней. Кратность опрыскиваний – 4. Инсайд® может применяться на всех стадиях развития картофеля, даже непосредственно перед уборкой или совместно с десикацией для предотвращения заражения клубней. На **луке** препарат используют до 3 раз, первый раз – профилактически, далее – с интервалом 7 – 10 дней. Обработки **виноградников** проводят в период вегетации: первую – профилактически до цветения, последующие – с интервалом 10 – 14 дней (до 3 опрыскиваний).

Рекомендуется добавление в рабочий раствор препарата адьюванта Полифем®.

При соблюдении регламентов применения препарата возникновение резистентности у патогенных организмов маловероятно. Для предотвращения проявления устойчивости следует чередовать фунгициды из различных химических классов с разным механизмом действия или использовать их смеси.

Инсайд® совместим с другими пестицидами, кроме препаратов, обладающих сильноокислой или сильнощелочной реакцией.



## Расход рабочей жидкости, л/га

На картофеле и луке – 200 – 400

На виноградниках – 800 – 1000

## Упаковка

Канистры по 5 л

| Культура                          | Заболевание        | Норма расхода препарата, л/га |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Картофель                         | Фитофтороз         | 0,8 - 1                       |
| Лук репчатый (кроме лука на перо) | Пероноспороз       |                               |
| Виноград                          | Милдью             | 0,9 - 1,2                     |
|                                   | Черная пятнистость | 1,2                           |

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

С нами расти легче

avgust crop protection